

	Anesteziolog MUDr. Robert Šachl, 733 756 509 VICEBAR s.r.o., Hejtmánkova 2359, 256 01 Benešov www.vicebar.cz	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Anestezie při zubním ošetření

Po získání termínu zubního ošetření v anestezii je ke spokojenosti všech potřeba následující:

- 1) Všichni pacienti/jejich zástupci **kontaktují** telefonicky anesteziologa, MUDr. Robert Šachl (733 756 509) a domluví se na dalším postupu.
 - 2) Vyplněný anesteziologický **dotazník** v den výkonu je předán anesteziologickému týmu. Dle Vašeho uvážení jistě můžete konzultovat se svým lékařem.
 - 3) **Podepsaný informovaný souhlas** je v den výkonu předán anesteziologickému týmu.
 - 4) **Zdravé** dítě nebo dospělý, bez známek infekce v den výkonu.
 - 5) Minimalizace následných komplikací.
- **Každý musí být před výkonem lačný.** Je nutné zajistit, aby **6 hodin** před výkonem nikdo nejedl a **2 hodiny nepil** čiré tekutiny (ne džus s kousky ovoce, ne mléko !). Po případě je nutné **4 hodiny** před výkonem již bez kojení. Mléko a džus s kousky dužiny jsou považovány za tuhou stravu.

Po anestezii musí být pacient pod **trvalým dohledem dle instrukcí anesteziologa**. Nesmí vykonávat žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost, při které by se mohl zranit, včetně her (prolézačky, kolotoče, jízda na kole) a nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné drogy.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Těšíme se na Vás

	Anesteziolog MUDr. Robert Šachl, 733 756 509 VICEBAR s.r.o., Hejtmánkova 2359, 256 01 Benešov www.vicebar.cz	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Anestezie při zubním ošetření

Jde o lékařskou péči pro jinak zcela zdravé děti (od 2let) a dospělé, kteří nespolupracují nebo vyžadují jakýkoliv typ **anestezie** (celková anestezie, regionální anestezie, analgosedace, anesteziologický dohled) při zubním zákroku.

Před ošetřením a podáním anestezie je bezpodmínečně nutné, aby klient **6 hodin nic nejedl a 2 hodiny nepil**. Kojení je možné naposledy **4 hodiny** před domluveným výkonem. Jinak celou dobu hrozí nebezpečí vdechnutí žaludečního obsahu s následkem nutnosti řešit komplikace pomůckami či transportem do nemocnice. **Je odpovědností rodičů, že je dítě lačné.** Komplikace vdechnutí žaludečního obsahu ohrožují postiženého bezprostředně na životě.

U dospělých a dětí ve věku od 2 let je možné zubní ošetření zvládnout v **analgosedaci**. Jde o typ anestezie, kdy je podávané takové množství anestetik (látek k navození spánku a bezbolestného vnímání), aby mohlo být zachované spontánní dýchání a řada dalších obraných reflexů. Pacient si nemusí na nic ke konci výkonu pamatovat. Analgosedace se používá při kratších typech zubního ošetření.

Při **celkové anestezii** je dítě usnáno jen několika nádechy anestetickým plynem, poté je zavedena nitrožilní kanyla a výkon pokračuje podáváním látek do žíly a/nebo vdechováním anestetické směsi. Dospělí či spolupracující pacient toleruje vpich nitrožilní kanyly a poté je usnán podáním anestezie nitrožilně. Pacient je v hlubokém spánku a na výkon si nepamatuje. Životní funkce jsou pod dohledem anesteziologického týmu. Toto je nejbezpečnější typ anestezie pro výkony vyžadující zajištění dýchacích cest. Takto vedené ošetření je komfortem pro pacienta, zubaře i starostlivého rodiče či doprovod.

Během každého výkonu jsou monitorovány životní funkce. Probouzení trvá v řádu minut a pacient se nechá dospát. Je dobré počítat s jednou hodinou klidného spánku po anestezii. Ještě před plným probuzením je z paže odstraněna nitrožilní kanyla, je-li použita.

Nejdříve za 2 hodiny po probuzení je možno s doprovodem propustit klienta domů. Plné odeznění útlumu trvá 3 až 6 hodin a po tuto dobu je nutno věnovat osobám **zvýšený dozor!** Dítě po anestezii nelze v den ošetření umístit do mateřské školky či školy! Během probouzení bývá někdy přítomen pláč či neklid dítěte, který je důsledkem změn vnímání okolního prostředí, není známkou bolesti či strachu a vše se brzy normalizuje.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ, PROSÍM, NEVÁHEJTE A OBRAŤTE SE NA NÁS.